



# TRANSFUSÃO

## CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS



### ATENÇÃO

Sempre identificar a causa da anemia e não tomar a decisão de transfundir apenas pelo nível de hematócrito/hemoglobina

Em caso de dúvida não prescreva a transfusão e solicite avaliação do médico hemoterapeuta/hematologista



Cada unidade transfundida implica em risco de reações adversas.



Verifique além do nível atual de hemoglobina se o paciente está sintomático.

### Indicações para transfusão de hemácias em adultos

Em casos tratáveis (Ex: anemias carênciais, anemia de doença crônica), **SEMPRE** tentar o tratamento **SEM** indicar transfusão, corrigindo a causa base  
Pacientes sem comorbidades portadores de anemia normovolêmica crônica, suportam muito bem os níveis de Hb entre 6 e 7 g/dl - não precisando de transfusão.

### Indicações para o uso no pré-operatório

Em pacientes cirúrgicos eletivos tratar a anemia **ANTES** da intervenção cirúrgica

**Aponte no QRCode e Baixe o folder sobre o PBM**

Procure se informar sobre o **“Patient Blood Management (PBM)”** - Gerenciamento de Sangue do Paciente e soluções **NÃO** transfusionais  
O PBM é uma diretriz da OMS e Secretaria do Estado e Saúde de SP

