

Você sabe o que é TACO?

TACO é a Sobrecarga Circulatória Associada à Transfusão.



RISCO DE TACO



SOBRECARGA CIRCULATÓRIA
ASSOCIADA À TRANSFUSÃO



PACIENTE COM MAIOR RISCO DE TACO

- Insuficiência cardíaca
- Insuficiência renal
- Idosos > 60 anos
- Transfusões rápidas ou de grande volume
- Outras condições clínicas de risco



COMO EVITAR



Respeitar o volume e a velocidade prescritos (máximo 4h de transfusão).



Acompanhar os primeiros 10 minutos da transfusão e monitorar todo processo.



Observar sinais de sobrecarga circulatória.



Na suspeita de sobrecarga pausar imediatamente a transfusão e chamar a equipe médica.

Como identificar?

Suspeite de TACO quando, **até 24 horas** após o término da transfusão, o paciente apresentar:



Dispneia ou desconforto respiratório



Taquicardia



Hipertensão arterial



Avalie:

- RX de tórax
- Saturação de O₂
- Relação PaO₂/FiO₂
- Balanço hídrico
- PVC
- BNP



TACO

- RX com edema pulmonar
- Balanço hídrico positivo
- PVC aumentada
- BNP aumentado



O QUE FAZER?

- 1 Avise imediatamente a equipe médica responsável pelo paciente.
- 2 Notifique o Banco de Sangue.
- 3 Caso a transfusão esteja em curso, suspenda imediatamente.



SEGURANÇA TRANSFUSIONAL:
SUA ATENÇÃO SALVA VIDAS!



HEMOVIGILÂNCIA:
COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DO PACIENTE.